

TD du chapitre 7

Exercices d'application directe du cours

Exercice n°1 Éléments cinématiques en coordonnées cartésiennes

On considère un point M en mouvement dont les coordonnées cartésiennes sont, à chaque instant :

$$\begin{cases} x(t) = a_0 t^2 + x_0 \\ y(t) = -v_0 t \\ z(t) = z_0 \end{cases} \quad \text{avec } x_0 = 1 \text{ m} , \quad z_0 = -1 \text{ m} , \quad a_0 = 2 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2} \quad \text{et} \quad v_0 = 3 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$$

- Q1. Déterminer les composantes des vecteurs vitesse et accélération dans la base cartésienne.
- Q2. Calculer la norme de la vitesse de M à la date $t = 2$ s.
- Q3. Calculer la norme de l'accélération de M à la date $t = 1$ s.

Exercice n°2 Éléments cinématiques en coordonnées cylindriques

On considère un point M en mouvement dont les coordonnées cylindriques sont, à chaque instant :

$$\begin{cases} r(t) = a_0 t^2 + r_0 \\ \theta(t) = \omega t + \theta_0 \\ z(t) = -v_0 t \end{cases} \quad \text{avec } r_0 = 1 \text{ m} , \quad a_0 = 1 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2} , \quad \omega = 3 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1} , \quad \theta_0 = 2 \text{ rad} \quad \text{et} \quad v_0 = 2 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$$

- Q1. Déterminer les composantes des vecteurs vitesse et accélération dans la base cylindrique.
- Q2. Calculer la norme de la vitesse de M à la date $t = 1$ s.
- Q3. Calculer la norme de l'accélération de M à l'instant initial $t = 0$ s.

Exercices ★

Exercice n°3 Électron dans le modèle de Bohr

Le modèle de Bohr est un modèle planétaire semi-classique de l'atome d'hydrogène (qui est composé d'un proton et d'un électron). Dans ce modèle, l'électron a une trajectoire circulaire et uniforme autour du proton, de rayon $a_0 = 0,53 \times 10^{-10}$ m. La fréquence de révolution est égale à $f = 6,6 \times 10^{15}$ Hz.

- Q1. Déterminer la vitesse de l'électron sur sa trajectoire et calculer sa norme.
- Q2. Déterminer l'accélération de l'électron et calculer sa norme.

Exercice n°4 Excès de vitesse 


Un conducteur roule à vitesse constante v_0 sur une route rectiligne. Comme il est en excès de vitesse à $100 \text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$, un gendarme à moto démarre à l'instant où la voiture passe à sa hauteur et accélère uniformément. Le gendarme atteint la vitesse de $90 \text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$ au bout de 10 s.

- Q1. Quel sera le temps nécessaire au motard pour rattraper la voiture ?
 Q2. Quelle distance aura-t-il parcouru ?
 Q3. Quelle vitesse aura-t-il alors atteinte ?

Exercice n°5 Cycliste sur un vélodrome 

On s'intéresse à un cycliste, considéré comme un point matériel M , qui s'entraîne sur un vélodrome constitué de deux demi-cercles reliés par deux lignes droites. Le cycliste part de D avec une vitesse nulle.

Données : $L = 62 \text{ m}$; $R = 20 \text{ m}$



- Q1. Il exerce un effort constant, ce qui se traduit par une accélération constante a_1 jusqu'à l'entrée E_1 du premier virage. Calculer le temps t_{E_1} de passage en E_1 ainsi que la vitesse v_{E_1} en fonction de a_1 et L .
 Q2. Dans le premier virage, le cycliste a une accélération tangentielle constante égale à a_1 . Déterminer le temps t_{S_1} de passage en S_1 ainsi que la vitesse v_{S_1} en fonction de a_1 , L et R .
 Q3. De même, en considérant l'accélération tangentielle constante tout au long du premier tour égale à a_1 , déterminer les temps t_{E_2} , t_{S_2} et t_D (après 1 tour), ainsi que les vitesses correspondantes.
 Q4. La course s'effectue sur 4 tours (1 km) mais on ne s'intéresse donc qu'au premier effectué respectivement en $T_1 = 18,155 \text{ s}$ (temps du britannique Chris Hoy aux championnats du monde de 2007). Déterminer la valeur de l'accélération a_1 ainsi que la vitesse atteinte en D . La vitesse mesurée sur une piste est d'environ $60 \text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$. Que doit-on modifier dans le modèle pour se rapprocher de la réalité ?

Exercice n°6 Ascenseur 

Un ascenseur est animé d'un mouvement rectiligne vertical ascendant :

- uniformément accéléré d'accélération $a_a = 2,0 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ pendant une durée $t_a = 3,0 \text{ s}$
- uniforme pendant une durée $t_u = 7 \text{ s}$
- uniformément décéléré d'accélération de norme $a_d = 1,0 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ pendant une durée t_d jusqu'à l'arrêt.

- Q1. Tracer la courbe représentant la vitesse en fonction du temps et en déduire la durée t_d . Déterminer la distance totale parcourue par lecture graphique.
- Q2. Tracer la courbe représentant l'accélération en fonction du temps. Comment peut-on vérifier que l'ascenseur s'est bien arrêté?
- Q3. Tracer l'allure de la courbe représentant la position en fonction du temps.

Exercices ★ ★

Exercice n°7 Durée d'un demi-tour en avion de chasse

Le rafale de Dassault Aviation est un avion de combat développé pour la marine nationale et l'armée de l'air françaises.

Données :

- accélération de la pesanteur : $g = 9,8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$
- un homme entraîné peut supporter une accélération maximale de $10 \times g$
- Caractéristiques de rafale : $m \approx 20$ tonnes ; vitesse maximale : $v = 2200 \text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$; altitude plafond : $h = 15 \text{ km}$


- Q1. Exprimer le vecteur vitesse $\vec{v}(M)_{(\mathcal{R})}$ et l'accélération $\vec{a}(M)_{(\mathcal{R})}$, par rapport à un référentiel (\mathcal{R}) sur la base polaire. Comment ces expressions sont-elles simplifiées dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme?
- Q2. Déterminer le rayon de courbure minimal tolérable pour un pilote.
- Q3. Quelle est la durée minimale d'un demi-tour en rafale à vitesse maximale?

Exercice n°8 Dilatation du temps en mécanique relativiste

Cet exercice illustre une conséquence de l'invariance de la vitesse de la lumière postulée par la relativité restreinte : la dilatation du temps dans un référentiel en mouvement.

On considère deux observateurs : un chef de gare immobile sur son quai et un contrôleur, immobile dans un train se déplaçant en mouvement rectiligne uniforme à la vitesse V par rapport au quai. Dans tout l'exercice, on distinguera le temps dans le référentiel du train \mathcal{R}' , noté t' et celui dans le référentiel \mathcal{R} du quai, noté t (ces deux référentiels étant galiléens).

À l'instant $t' = 0$, le contrôleur envoie une impulsion lumineuse (faisceau laser par exemple), verticalement vers un miroir situé à une distance L . Cet instant est également choisi comme l'instant $t = 0$ dans \mathcal{R} . À cet instant, le contrôleur est en O' , le chef de gare en O et $O = O'$.



- Q1. On raisonne tout d'abord dans le référentiel \mathcal{R}' . En admettant que la lumière s'y propage à c , quel est le temps T' mis par la lumière pour atteindre le miroir et revenir au contrôleur ?
- Q2. On admet que conformément à la théorie de la relativité restreinte, la lumière se propage également à c dans le référentiel \mathcal{R} . Compte-tenu du déplacement de M dans \mathcal{R} durant la propagation lumineuse, son trajet y est triangulaire.
- (a) Établir la relation entre l'angle α (fait par la direction du faisceau lumineux avec l'horizontale dans \mathcal{R} , c , L et le temps T mis par la lumière pour revenir au contrôleur dans \mathcal{R} .
- (b) Établir une autre relation entre α , V et c . En déduire T .
- Q3. En conclure que l'invariance de la vitesse de la lumière dans les deux référentiels implique qu'on a $T = \gamma T'$, avec $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}$. Justifier alors le terme de « dilatation des durées » entre \mathcal{R} et \mathcal{R}' .

Exercice n°9 Trajectoire d'un point d'une roue

On repère un point M sur la circonférence d'une roue de rayon R . Initialement, ce point M coïncide avec O , origine du repère. Ensuite, au cours du mouvement, on appelle $\theta(t)$ l'angle \overrightarrow{CM} et la verticale descendante. La roue roule sans glisser sur le sol de telle manière que l'abscisse x_I du point de contact I de la roue avec le sol soit égale à l'arc de cercle IM . Le vitesse du centre C de la roue est $\overrightarrow{v(C)} = v_0 \overrightarrow{u_x}$ où v_0 est une constante positive.

- Q1. Faire un schéma.
- Q2. Trouver les coordonnées cartésiennes $(x(t), y(t), z(t))$.
- Q3. Tracer la trajectoire du point M sur la calculatrice.

Exercice n°10 Course de souris

Quatre souris, A , B , C et D se trouvent aux quatre coins d'un carré de côté $ABCD$ de côté a et chacune court après l'autre avec la même vitesse constante v . A court après B , B après C , C après D et D après A .

- Q1. Faire un schéma.
- Q2. Au bout de combien de temps se rencontreront-elles ?
- Q3. Quelle distance L auront-elles parcourue ?
- Q4. Déterminer la trajectoire de la souris A , avec comme conditions initiales en coordonnées polaires :

$$A \left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{3\pi}{4} \right) ; B \left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{4} \right) ; C \left(\frac{a}{\sqrt{2}}, -\frac{\pi}{4} \right) ; D \left(\frac{a}{\sqrt{2}}, -\frac{3\pi}{4} \right)$$